



泮立苏

泮托拉唑钠肠溶胶囊说明书（简化版）

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用。

本说明书为简化版说明书，如您想了解药物最新完整的信息，请详见电子版。（可通过微信/支付宝扫描左上方二维码）



【药品名称】

通用名称：泮托拉唑钠肠溶胶囊

商品名称：泮立苏

【成份】

本品主要成份为泮托拉唑钠。

辅料：无水亚硫酸钠、甘露醇、依地酸二钠、玉米淀粉、无水碳酸钠、羟丙甲纤维素、二氧化钛、甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物及其水分散体、枸橼酸三乙酯、滑石粉、明胶空心胶囊

【性状】本品内容物为白色或类白色肠溶微丸。

【适应症】

- 十二指肠溃疡
- 胃溃疡
- 中、重度反流性食管炎
- 与下述药物配伍用能够根除幽门螺杆菌感染：

- 克拉霉素和阿莫西林，或
- 克拉霉素和甲硝唑，或
- 阿莫西林和甲硝唑

（详见用药方法）以减少该微生物感染所致的十二指肠溃疡与胃溃疡的复发。

提示

泮托拉唑不用于治疗病变轻

微的胃肠道疾患，如神经性消化不良。

在应用泮托拉唑治疗胃溃疡前，须除外胃与食道的恶性病变，避免因症状缓解而延误诊断。

反流性食管炎的诊断应经内镜检查核实。

【规格】

按 $C_{16}H_{15}F_2N_3O_4S$ 计40mg。

【用法用量】

本品若无医师特殊处方，应按下述方法服用，请遵守这些方法，否则可能疗效不佳。

对伴有幽门螺杆菌感染的十二指肠溃疡或胃溃疡须用联合疗法根除感染。泮托拉唑与抗菌药物的联合使用可采取下述任何一种方案：

a. 1粒泮托拉唑钠肠溶胶囊 × 2次/日 + 1000mg阿莫西林 × 2次/日 + 500mg 克拉霉素 × 2次/日

b. 1粒泮托拉唑钠肠溶胶囊 × 2次/日 + 500mg甲硝唑 × 2次/日 + 500mg 克拉霉素 × 2次/日

c. 1粒泮托拉唑钠肠溶胶囊 × 2次/日 + 1000mg阿莫西林 × 2次/日

+ 500mg甲硝唑 × 2次/日

在联合疗法中，有甲硝唑的方案仅在其他方案不能根除幽门螺杆菌感染的情况下方予使用。

若患者无联合疗法的指征，如检查幽门螺杆菌阴性，泮托拉唑可按下述剂量单独使用，除非另有医师处方：

十二指肠溃疡、胃溃疡和反流性食管炎患者一般每日服用1粒泮托拉唑钠肠溶胶囊。个别病例，特别是在其它治疗方法无效的情况下，可将剂量加倍（即每日2粒泮托拉唑钠肠溶胶囊）。

注意

肾功能受损和老年患者每日泮托拉唑的剂量一般不应超过40mg，但有些情况例外，即为根除幽门螺杆菌感染而使用联合疗法时，老年患者在1周治疗中也使用常规剂量（40mg × 2次/日）的泮托拉唑。

严重肝功能受损的患者剂量应减少至隔日1粒（40mg泮托拉唑钠肠溶胶囊）。

服药方式与疗程

本品不能咀嚼或咬碎，应在早餐前1小时配水完整服用。为根除幽门螺杆菌感染而使用联合疗法时，每日第2次服药应在晚餐前进行。联合疗法一般持续7天。此后如症状持续存在，需继续服用泮托拉唑以保证溃疡的完全愈

合，用药应遵守治疗胃、十二指肠溃疡的推荐剂量。

通常十二指肠溃疡在2周内愈合，如果2周的疗程不够，可继续延长治疗2周。

胃溃疡和反流性食管炎需要治疗4周。如果疗程不够，可继续延长治疗4周。

由于长期用药的经验有限，疗程不宜超过8周。

【禁忌】

本品不能用于已知对该药的某种成份过敏的患者。

本品禁止与含利匹韦林的药品联用。

在根除幽门螺杆菌感染的联合疗法中，有中、重度肝肾功能障碍的患者禁用本品，因为目前尚缺乏联合疗法对这类患者疗效及安全性的临床经验。

【贮藏】密封，25℃以下保存。

【上市许可持有人】

名称：

杭州中美华东制药有限公司
电话号码：0571-89903388(总机)，8008571016，4009057136
传真号码：0571-89903366
如有问题可与药品上市许可持有人联系。