



泮立苏

泮托拉唑钠肠溶胶囊说明书(简化版)

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本说明书为简化版说明书，如您想了解药物最新完整的信息，请详见电子版。
(可通过微信/支付宝扫描左上方二维码)

【药品名称】

通用名称：泮托拉唑钠肠溶胶囊

商品名称：泮立苏

【成份】本品主要成份为泮托拉唑钠。

【性状】本品内容物为白色或类白色肠溶微丸。

【适应症】治疗轻度反流性食管炎及其伴随症状（如烧心、反酸、吞咽疼痛）；用于反流性食管炎的长期维持治疗，防止复发。治疗活动性消化性溃疡（胃、十二指肠溃疡）和卓-艾氏综合症。

【规格】按 $C_{16}H_{15}F_2N_3O_4S$ 计20mg

【用法用量】本品不能咀嚼或咬碎，应在早餐前用水完整服用。

1.治疗轻度反流性食管炎及其伴随症状（如烧心、反酸、吞咽疼痛）：
推荐本品口服剂量为每日20mg(1粒)，

通常在2~4周内使用者的症状能够得到缓解。4周的疗程用于治愈伴发的食管炎；如果4周内不能愈合，通常需再进行4周的治疗。

2.用于反流性食管炎的长期维持治疗，防止复发：

长期维持治疗，推荐剂量为每日20mg（1粒）。如复发可将剂量增至每日40mg（2粒），复发治愈后可将剂量减至每日20mg（1粒）。因为还未获得本品长期使用的安全性数据，只有在充分考虑风险/利益后，长期维持治疗的疗程才可超过1年。

3.十二指肠溃疡、胃溃疡，每日早晨口服40mg（2粒）。十二指肠溃疡疗程通常为2~4周，胃溃疡疗程通常为4~8周。

4.严重肝功能障碍的患者，每日剂量一般不应超过20mg（1粒）。

【禁忌】1.哺乳期妇女及妊娠三个月内妇女禁用。

2.对本品过敏者禁用。

【贮藏】遮光，密封，在阴凉处保存。

【上市许可持有人】

名称：杭州中美华东制药有限公司

电话号码：0571-89903388(总机)，
8008571016，4009057136

传真号码：0571-89903366

如有问题可与药品上市许可持有人联系。